

škodlivý činitel	účinná látka	název přípravku	povolený obsah zb.reziduí v ppm	ochranná lhůta	pozn.
Lalokonosec libečkový Dřepčík, Klopuška, Šedavka	Lambda-Cyhalothrin	Karate Zeon	10	14	1.
	Thiametoxam	Actara 25 WG	0,1		
Mšice chmelová	Imidacloprid	Confidor 200 OD, Warrant 700 WG	6	35	
	Pymetrozin	Plenum 50 WG, Chess	6	21	
	Flonicamid	Tepeki	2	21	
	Spirotetramat	Movento 150 OD	10	21	
Sviluška chmelová	Abamectin	Vertimec, Safran, Vargas	0,05	28	5. 6. 4.
	Fenpyroximat	Ortus 5 SC	10	21	
	Acequinoxyl	Kanemite 15S	4	21	
	Bifenazate	Acramite 480SC	15	14	
	Hexythiazox	Nissorun 10 WP	2	28	
Perenospora chmelová <i>Primární a sekundární infekce</i>	Mandipropamid	Revus	50	14	2.
	Cymoxanil	Curzate K	2	7	
	Cu - oxychlorid, hydroxid	Kuprikol, Cuproxat a ostatní	1000	7	
	Azoxystrobin	Ortiva	20	28	
	Fosetyl - Al	Aliette 80 WG	45	14	
	Biopreparäte	Alginure			
	Pyraclostrobin, boscalid	Bellis	15+35	28	
Padlí chmelové	Síra	Sulikol, Kumulus WG	100	8	3.
	Tebuconazole	Horizon 250 EW	30	21	
	Quinoxifen	IQ Krystal	1	35	
Plevelé, chem.dočištění	Deiquat dibromide	Dessicash 20% SL	0,04	14	7.
	Glyphosate	Agroklasik Plus, Touchdown Quattro	0,1		
Okus srnčí zvěří	Ovčí tuk (Sheep fat)	Trico			

- 1.Thiametoxam (Actara): lze použít jen při jarní aplikaci v pásovém postřiku, postřiku nebo rosením
 2. Cu: maximálně lze použít 4 kg čisté Cu/ha za rok
 3. Quinoxifen(IQ Krystal): max. 2 použití za vegetaci
 4. Bifenazate (Acramite): lze použít pouze 1x za vegetaci
 5.Fenpyroxinal (Ortus): lze použít pouze 1x za vegetaci
 6.Acequinoxyl (Kanemite): lze použít pouze 1x za vegetaci
 7.Deiquat, Dibromide (Dessicash 20% SL): max. dávka 1,67 l/ha

Je zakázáno použití přípravků ze souběžných dovozů!

Je zakázáno používat veškeré stimulatory růstu!

Prohlášení:

Závazně potvrzuji vlastním podpisem, že jsem obdržel seznam prostředků pro ochranu chmele sklizně 2016 a jiné prostředky nebudu používat.

Zároveň se se zavazuji, že u všech prostředků dodrším předepsanou ochrannou lhůtu.

datum

firma

podpis