

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 2014

Česká republika



Škodlivý činitel	Účinná látka	Název přípravku	Povolený obsah zb. reziduí v ppm	Ochranná lhůta	Poznámka
Lalokonosec libečkový Dřepčík, Klopuška, Šedavka	Lambda-Cyhalothrin Thiametoxam	Karate Zeon Actara 25 WG	10 0,1	14	1.
Mšice chmelová	Imidacloprid Pymetrozin Flonicamid Spirotetramat	Confidor 200 OD, Warrant 700 WG Plenum 50 WG, Chess Teppeki Movento 150 OD	6 6 2 10	35 21 21 21	
Sviluška chmelová	Abamectin Fenpyroximat Acequinoxyl Bifenazate Hexythiazox	Vertimec Ortus 5 SC Kanemite 15S Acramite 480SC Nissorun 10 WP	0,05 10 4 15 2	28 21 21 14 28	5. 6. 4.
Perenospora chmelová <i>Primární a sekundární infekce</i>	Metalaxyl – M Cymoxanil Cu Azoxystrobin Fosetyl – Al Fosetyl Al/Cu-Oxychlorid Biopreparáte Pyraclostrobin, boscalid	Ridomil Gold Curzate K Kuprikol a ostatní Ortiva Aliette 80 WG Aliette Bordeaux Alginure Bellis	10 2 1000 20 45 45+1000 10+35	7 7 28 14 14 28	2.
Padlí chmelové	Síra Tebuconazole Quinoxifen	Sulikol, Kumulus WG Horizon 250 EW IQ Krystal	100 30 2	8 21 35	3.
Plevele, chem. dočištění	Deiquat, dibromide	Dessicash 20% SL	0,04	14	

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 2014

Česká republika



1. **Thiametoxam (Actara):** lze použít jen při jarní aplikaci v pásovém postřiku (zálivka)
2. **Cu:** doporučení: maximálně lze použít 4 kg čisté Cu/ha za rok
3. **Quinoxifen(IQ Krystal):** max. 2 použití za vegetaci
4. **Bifenarate(Acramite):** lze použít až po schválení - toto bude sděleno písemně
5. **Fenpyroxinal (Ortus):** lze použít pouze 1x za vegetaci
6. **Acequinoxyl (Kanemite):** lze použít pouze 1x za vegetaci

Je zakázáno použití přípravků ze souběžných dovozů!

Je zakázáno používat veškeré stimulatory růstu!

Prohlášení:

Závazně potvrzuji vlastním podpisem, že jsem obdržel seznam prostředků pro ochranu chmele sklizně a jiné prostředky nebudu používat. Zároveň se se zavazuji, že u všech prostředků dodržím předepsanou ochrannou lhůtu.

datum

firma

podpis